

# Butasan Gel



(Fenilbutazona)

Uso Veterinario

**Descripción:** Antiinflamatorio no esteroide para equinos

**Composición:** Cada dosis contiene: Fenilbutazona 1 g, Excipientes c.s.p. 10 ml

**Indicaciones:** Inflamaciones músculoesqueléticas del caballo. Inflamaciones agudas localizadas del aparato locomotor, como artritis, tendinitis, miositis, sinovitis, infosura, etc. Traumatismos en general. Tratamientos post-quirúrgicos de todo tipo, como suturas de heridas cutáneas, cirugía del aparato locomotor, cirugía abdominal, etc. (no interfiere el proceso de cicatrización). Puede usarse junto a cualquier tipo de terapia antiinfecciosa (no interfiere con las defensas del organismo).

**Acción terapéutica:** La fenilbutazona es un conocido antiinflamatorio no esteroide, cuya acción se basa en la inhibición de la producción de prostaglandinas en el organismo. Esto explica su efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Carece de los efectos secundarios de los corticoides, destacando especialmente la ausencia de interferencia con los procesos de cicatrización o de defensa frente a infecciones. El sabor naturalmente amargo de la fenilbutazona, ha sido enmascarado con saborizantes para facilitar la aceptación del equino

**Dosis y Administración:** La pauta terapéutica general, salvo indicación diferente por parte del Médico Veterinario es la siguiente: Día 1: 4,4 mg/kg cada 12 horas (2 medidas dosificadoras de 10 ml cada 12 horas, para un caballo de 450 kg). Días 2 a 5: 2,2 mg/kg cada 12 horas (1 medida dosificadora de 10 ml cada 12 horas, para un caballo de 450 kg). En los casos de lesiones inflamatorias crónicas, el tratamiento intermitente puede ser valioso para aliviar los síntomas. Administrar por vía oral, mezclando con la ración diaria. Es imprescindible que el caballo disponga siempre de agua de bebida en abundancia.

**Especies:** Equinos

**Advertencias:** No administrar a animales con evidente daño cardíaco, hepático o renal; o con un historial de discrasia sanguínea, o aquellos con signos de anemia. Detener el tratamiento al primer signo de trastorno gastrointestinal, discrasia sanguínea, ictericia y deposiciones alquitranadas o negras. Debe ser utilizado con precaución en los pacientes que tengan historia de alergia a la droga. No administrar a equinos destinados a consumo humano. Conservar el producto entre 5 y 30°C. Evitar el congelamiento y el calor excesivo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones TE: 0800-333-0160

**Presentación:** Envases de 100 y 500 ml con un dosificador.

**Venta bajo receta**

SENASA Certif. N° 05-001

Estab. Elab. N° 8.487

**Interbio Pharma S.R.L.**

Av. L.N. Alem 1698

(2752) Capitán Sarmiento. Buenos Aires, Argentina

Tel: (54) 02478 48-2373

Web: [www.interbio.com.ar](http://www.interbio.com.ar) - e-mail: [info@interbio.com.ar](mailto:info@interbio.com.ar)

Dir. Téc. Dr. Jorge Casim. M.V. M.P. N° 9.093