

Dexatop



**Antiinflamatorio corticoide
(Isonicotinato de dexametasona)**

Uso Veterinario

Descripción: Corticoide de alta potencia glucogénica y antiinflamatoria.

Composición: Cada ml contiene 1 mg de Dexametasona-21-isonicotinato, en una suspensión acuosa macrocristalina.

Indicaciones: En Equinos, Bovinos, Porcinos Caninos y Felinos: como antiinflamatorio, antialérgico y para aumentar la tolerancia a las toxinas en caso de infecciones. **Equinos:** Artritis, tendovaginitis, lumbago, bursitis, EPOC, pododermatosis, azoturia, bronconeumonía, **Bovinos:** Acetonemia, paresia puerperal, paraplejia ante y postpartum, tetanias, artritis, tenosinovitis, bursitis, bronconeumonía, mastitis, metritis. **Porcinos:** Agalactia, artritis, eclampsia, intoxicaciones, enfermedad edematosas, prevención del shock, bronconeumonía, Complejo MMA. **Caninos y Felinos:** Eczemas, bronquitis, dermatitis, artritis no sépticas, estados inflamatorios y/o alérgicos, síndrome de disco intervertebral.

Acción terapéutica: Dexatop está recomendado en aquellos procesos clínicos en los que se requiere una terapia corticoesteroide energética y continuada. La tolerancia local y general es excelente.

Dosis y Administración: Suministrar por vía IM o EV. Equinos: 10-15 ml (2ml/100 kg p.v.) 0,02 mg / kg.p.v. Bovinos: 10-15 ml (2ml/100 kg p.v.) 0,02 mg / kg.p.v. Inducción al parto en vacas 20 ml. Porcinos: 3-5 ml 0,05 a 0,1 mg / kg.p.v. Caninos y Felinos: 1-2 ml 0,05 a 0,1 mg / kg.p.v.

Especies: Equinos, Bovinos, Porcinos, Caninos, Felinos.

Advertencias: Agitar antes de usar. No exceder la dosis recomendada. Está contraindicado en procesos osteoporósicos, diabetes mellitus, tuberculosis activa e infecciones virales. No debe ser usado en casos de úlcera gástrica, insuficiencia renal y/o hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, úlcera de cornea, glaucoma. Se recomienda no administrar a hembras grávidas durante el último tercio de la gestación. En caso de infección no administrar sin una protección antibiótica previa. Conservar el producto entre 5 y 30° C. Evitar el congelamiento y el calor excesivo.

Mantener fuera del alcance de los niños. Centro Nacional de Intoxicaciones

TE: 0800-333-0160.

Presentación: Frasco ampolla de 10 ml

Venta bajo receta.

SENASA Certif. N° 09-004. Estab. Elaborador N° 8.487

Interbio Pharma S.R.L. Av. L.N. Alem 1698 (2752) Capitán Sarmiento, Buenos Aires. Argentina. Tel.: (54) 02478 48-2373 · Web: www.interbio.com.ar · E-mail: info@interbio.com.ar

Director Técnico: Dr. Jorge Casim. M.V. M.P. N° 9.093