

Meflux



Antiinflamatorio no esteroide

(Flunixin Meglumina)

Uso Veterinario

Descripción: Antiinflamatorio, analgésico, antipirético.

Composición: Cada ml contiene: Flunixin 50 mg, Excipientes c.s.p.: 1,0 ml.

Indicaciones:

Equinos: Alivio de lesiones inflamatorias del aparato locomotor, miositis, osteitis, artritis, tendinitis, sinovitis. Cólicos: alivio del dolor visceral asociado con la presentación de cólicos

Bovinos: Tratamiento de soporte en infecciones agudas (particularmente en el complejo respiratorio bovino).

Diarreas neonatales del ternero. Tratamiento del dolor agudo causado por cirugía, heridas, lesiones del aparato locomotor.

Porcinos: Tratamiento del síndrome metritis-mastitis-agalaxia. Inflamaciones agudas y crónicas del aparato locomotor.

Caninos: Alivio en lesiones inflamatorias del aparato locomotor, miositis, osteitis, artritis, tendinitis, sinovitis. Cuadros de dolor agudo, incluyendo el shock endotóxico producido por procesos infecciosos virales o bacterianos. Coadyuvante en el tratamiento de la parvovirus canina.

Acción terapéutica: Flunixin meglumina es un potente analgésico sin acción narcótica ni esteroide, con actividad antiinflamatoria y antipirética.

Dosis y Administración:

Equinos: La dosis recomendada para los desórdenes músculo-esqueléticos es de 1,1 mg/kg p.v. que equivale a 1 ml (50 mg de Flunixin) cada 45 kg p.v. por vía IM o EV, una vez por día y se puede repetir hasta no más de 5 días consecutivos. El inicio de la actividad farmacológica es dentro un plazo de 2 horas. La respuesta máxima ocurre entre 12 y 16 hs. y la duración de la actividad es de 24-36 hs. La dosis recomendada para el alivio del dolor asociado al cólico equino es de 1 ml cada 45 kg p.v. Se recomienda la administración EV para el rápido alivio del dolor. Estudios clínicos demuestran el alivio del dolor en menos de 15 minutos en muchos casos. El tratamiento puede ser repetido cuando reaparecen los síntomas del cólico. Durante estudios clínicos el 10% de los caballos requirió aproximadamente uno o dos tratamientos adicionales. La causa del cólico se debe determinar y tratar con la terapia correspondiente.

Bovinos: 1,1 a 2,2 mg/kg p.v. (de 1,1-2,2 ml cada 50 kg p.v.).

Terneros: 2 a 3 ml como dosis única.

Porcinos: 2,2 mg/kg p.v. (0,44 ml cada 10 kg p.v.).

Caninos: entre 1,1 y 2,0 mg/kg p.v. (de 0,22-0,4 ml cada 10 kg p.v.).

Especies: Equinos, Bovinos, Porcinos y Caninos.

Advertencias: La inyección intraarterial debe ser evitada. Los caballos inyectados accidentalmente por esa vía, pueden presentar reacciones adversas como ataxia, incoordinación, hiperventilación, histeria, y temblores musculares. Los síntomas son transitorios y desaparecen sin ningún tipo de medicación después de unos minutos.

En caso de intoxicación accidental suspender el tratamiento e iniciar terapia de soporte. No exceder la dosis recomendada. En la inyección IM es recomendable repartir la dosis en dos puntos de aplicación.

Contraindicaciones: No usar en hembras gestantes, en animales alérgicos o sensibles al Flunixin Meglumina. No usar en casos de daño renal o hepático severos ni en animales con lesiones de mucosa gastrointestinal causadas por endoparásitos. No usar en cólicos causados por fleo y asociados con deshidratación. No aplicar a equinos en training en los 8 días previos a la carrera. No aplicar a equinos destinados a consumo alimentario humano. No administrar a caninos menores de 3 meses de edad. Debe evitarse el uso prolongado en caninos debilitados o cuando se esté administrando otra terapia antiinflamatoria. Periodos de restricción para consumo humano de animales tratados: Bovinos: 7 días prefaena y 5 días preordeño, Porcinos: 21 días prefaena. Conservar el producto entre 5 y 35° C. Evitar el congelamiento y el calor excesivo. No administrar a equinos destinados a consumo humano. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160

Presentación: Frasco ampolla de 10 y 50 ml.

Venta bajo receta.

SENASA Nº 11-082

Estab. Elab. Nº 8.487

Interbio Pharma S.R.L. Av. L.N. Alem 1698 (2752) Capitán Sarmiento, Buenos Aires. Argentina. Tel.: (54) 02478 48-2373 · Web: www.interbio.com.ar · E-mail: info@interbio.com.ar

Director Técnico: Dr. Jorge Casim. M.V. M.P. Nº 9.093